

# インフルエンザ予防接種 2017年度

インフルエンザワクチンを接種すると、かかっても重症化を予防することが可能です。

接種の効果が現れるまで約2週間かかり、約5か月持続するとされています。流行する前に接種しましょう。

## ◆予約開始

2017年 9月19日

## ◆実施予定期間

2017年10月16日 ~ 2018年 1月31日

7F施設休

## ◆受付時間

13:30 ~ 16:30 ※終了時間に変動あり



## ◆予約専用ダイヤル

03-6909-3632

【9:00~17:00 土日祝祭日除く】

※健康診断同日の接種も可能です。

※ワクチンの在庫がなくなり次第、ご案内終了とさせていただきます。

### 10月

月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

### 11月

月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

### 12月

月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

### 1月

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## ◆費用

1回 3,890円 (税込)

※契約健康保険組合によって、補助額やお申込み方法が異なります。ご確認の上お申込みください。

### 次の方は当クリニックで接種ができません

- 1) 明らかに発熱している方 (通常は37.5℃を超える場合)
- 2) 重い急性疾患にかかっている方
- 3) 本剤の成分により、アナフィラキシー (通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のひどいじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと) を起こしたことがある方
- 4) 妊娠中または妊娠の疑いのある方 (授乳中の接種は可能)
- 5) 16歳未満の方
- 6) その他、いつも診てもらっている医師にワクチンは受けない方がいいといわれた方

### 次の方は接種前に医師にご相談ください

- 1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患および血液疾患などの基礎疾患のある方
- 2) 薬の投与または食事 (鶏卵、鶏肉など) で発疹が出たり異常をきたしたことがある方
- 3) 過去にけいれん (ひきつけ) の既往歴のある方
- 4) 過去にインフルエンザの予防接種を受けた時、2日以内に発熱、全身性の発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状のみられた方
- 5) 過去に免疫状態の異常を指摘されたことがある方もしくは、近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
- 6) 気管支喘息のある方
- 7) 家族・会社内などの間に麻疹 (はしか)、風しん、おたふくかぜ、水痘 (みずぼうそう) などの病気が流行しているときで、まだその病気にかかったことがない方
- 8) 1か月以内に予防接種を受けた方

## ◆2017年度インフルエンザHAワクチン製造株

A型株	B型株
A/シンガポール/GP1908/2015 (IVR-180) (H1N1) pdm09	B/プーケット/3073/2013 (山形系統)
A/香港/4801/2014 (X-263) (H3N2)	B/テキサス/2/2013 (ビクトリア系統)